

# תוספת

(תקנה 11)

## חלק א' - תאונות-עבודה

### פרק ראשון<sup>1</sup>

#### מבוא

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחזר ניתוחים באברים הפנימיים

#### 1. בלוטות הלימפה

##### (1) שחפת של בלוטות הלימפה

(א)

- 0% (I) שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות.  
(II) נשארו צלקות נרחבות או מכערות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות.
- 30% (ב) שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים).
- 100% (ג) שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשת אישפוז או שכיבה
- 0% (2) ADENOPATHIA (תפיחות הבלוטות) בלתי-פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין.
- (3) למפומה ממאירה MALIGNANT LYMPHOMA (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו').
- 50% (א) במצב של רמיסיה (REMISSIO) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית.
- 100% (ב) במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו').

#### 2. מחלות דם

אנמיה (מחוסר-דם ממאיר, מחוסר-ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנט, הפרעות בהקרשת דם.

- 0% (א) מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים.
- 20% (ב) מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים.
- 50% (ג) מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת.
- 75% (ד) מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד.
- 100% (ה) מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד.

#### 3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה).

הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -

<sup>1</sup> הפריטים המסומנים ב-\* אינם מובאים בחשבון לענין קיצבת נכות כללית. הפריטים המסומנים ב-\*\* אינם מובאים בחשבון לענין קצבת שירותים מיוחדים. הפריטים המסומנים ב-\*\*\* אינם מובאים בחשבון לענין קצבת נכות כללית ושירותים מיוחדים.

למרות האמור בהערה 1, בפועל כל סעיף לקיו המנופה לנכות מנופה לשר"ם. התוספת לתקנה 2 (ב) לתקנות שר"ם תקון בהתאם.

הערה: התוספת המקורית פורסמה בק"ת תשט"ז, עמ' 864 ותוקנה בק"ת תשט"ז, עמ' 1094, תשכ"ד, עמ' 150.

בק"ת 2533, תשל"ל, עמ' 1159, ת"ת 15.3.70, הוחלף חלק א' של התוספת.

בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת 27.6.74, בכותרת במקום "(תקנה 12)" בא "(תקנה 11)".

0%	(א) בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה.
10%	(ב) מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה.
20%	(ג) המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול.
40%	(ד) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת.
50%	(ה) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת.
75%	(ו) המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד
100%	(ז) המצב חמור מאד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסייעוד

#### 4. סכרת <sup>2</sup>DIABETES MELLITUS

0%	(1) הפרעה בסבילות לפחמימות. IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE
*5%	(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד.
10%	(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים
20%	(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין
40%	(5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי ב. סוכרת "שבירה" (BRITTLE) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד

<sup>2</sup> פרט 4 (2) - הניפוי לענין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בענינו לאחר יום התחילה.

פרט 4 - בנוסח מקורי:

10%***	(א) הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד (160 %MG ביום), אין הפרשת סוכר בשתן או הפרשה קלה (שאינה עולה על 15 GR ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות
20%**	(ב) המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות בצורת כדורים או כמות INSULIN שאינה עולה על 20 יחידות ליממה
30%	(ג) החולה זקוק לכמות INSULIN בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים
40%	(ד) המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד
50%	(ה) החולה זקוק לכמות INSULIN עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים וכו'
70%	(ו) סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות INSULIN ביממה, מלווה מזמן לזמן בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים (JUVENILE BIRTTLW DIABETES)
100%	(ז) סכרת קשה מאד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה
	(ח) הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א1- אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגמות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה."

בק"ת 5856, התשנ"ה, עמ' 2, ת"ת 12.10.97, הוחלף לנוסח דלעיל.

(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

- א. נירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);
  - ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR);
  - ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
  - ד. מחלת כלי דם היקפיים
  - ה. מחלת כלי דם כליליים.
- 65%
- לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים
- (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 100% של 30% ומעלה

5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

(1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (BRONCHIECTASIS)

- (א) קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%
- (ב) קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ 20% או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים
- (ג) קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%
- (ד) קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים 60%
- (ה) קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי COR PULMONALE 100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - FISTULA OR BRONCHOCUTANEOUS

BRONCHO-PLEURAL FISTULA אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינקוקוס בריאה

- (א) ציסטה קטנה מסויידת 0%
- (ב) ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%
- (ג) ציסטות בשתי הריאות 40%
- (ד) קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

(4) מצב לאחר אכינקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול

(5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית החזה

- (א) זעיר ואינו גורם להפרעות 0%
- (ב) הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת \*10%
- (ג) הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוריה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או 30%

HEMOPTYSIS

- (ד) הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%

6. קצרת הסמפונות ASTHMA BRONCHIALE

- (א) ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0%
- (ב) ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20%
- (ג) ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%
- (ד) מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף (1)5. 40%

**7. שחפת הריאות**

	<b>שחפת פעילה</b>	<b>(1)</b>
100%	(א) יש צורך בטיפול ובשכיבה	
60%	(ב) שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה	
60%	(ג) התחדדות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית	
	(ד) שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:	
80%	(I) השינויים בריאה נרחבים FAR ADVANCED	
60%	(II) השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת MOD. OR MIN. ADVANCED	
60%	(ה) שחפת ריאות בטיפול ב-PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS	
	<b>שחפת בלתי-פעילה</b>	<b>(2)</b>
50%	(א) בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות	
*35%	(ב) בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א)	
	(ג) בכל תקופה שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (ב):	
*10%	(I) לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת	
20%	(II) נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת	
30%	(III) נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה	
	(ד) ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.	
	(ה) ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.	
	<b>מצבים שלאחר ניתוחים</b>	<b>(3)</b>
10%	(א) שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת	
	(ב) PLOMBAGE	
30%	(I) חד-צדדי	
60%	(II) דו-צדדי	
	(ג) כריתות בריאה	
*10%	(I) של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים	
30%	(II) של אונה	
60%	(III) של ריאה שלמה	
100%	(IV) קיימים סיבוכים כגון EMPYEMA OR FISTULA BRONCHO CUTANEA	
	<b>מצבים שלאחר כריתת צלעות</b>	<b>(4)</b>
0%	(א) לאחר כריתת צלע אחת	
*10%	(ב) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד	
20%	(ג) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד	
30%	(ד) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד	
50%	(ה) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד	

אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי יחשבו לפי סעיפים קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.

**8. קרום הריאה**

	<b>תוצאות של דלקת קרום הריאה</b>	<b>(1)</b>
0%	(א) קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות	
*10%	(ב) ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב	

- הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת
- (ג) ישנן התדבקות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית 20%
- (ד) ישנן התדבקות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%

- (2) **דלקת קרום הריאה שחפתית**
- (א) קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%
- (ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%
- (ג) בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.
- (3) **דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA**
- (א) במצב חריף 100%
- (ב) במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%
- (ג) שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקות פלוירליות או פלוירו-פריקדיאליות 50%
- (ד) קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה
- (ה) שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8(1).

### 9. מחלות הלב

- (1) **במחלת לב שגרונת חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.)**

- ובאטם שריר הלב**
- (א) בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%
- (ב) בתקופת 3 החדשים הבאים 50%
- (ג) לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -
- (I) מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%
- (II) מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%
- (III) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שנייה) 40%
- (IV) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור 50%
- פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית)
- (V) קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%
- (VI) אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%

- (2) **תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS)**

- (א) התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%
- (ב) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%
- (ג) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%

- (3) **יתר לחץ דם**

- (א) לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0%
- (ב) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:
- (I) בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקורדיוגרפית) של הלב 10%\*\*\*
- (II) עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%
- (ג) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:
- (I) בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%\*\*
- (II) עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%

- (4) **הפרעות בקצב**

- (א) התקפיים:
- (I) התקפים נדירים 10%\*\*\*
- (II) התקפים שכיחים 20%
- (III) התקפים שכיחים ביותר 40%

- (ב) קבועים
- (I) ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני \*\*20%
- (II) קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב
- (ג) מחסום פרודורי-חדרי
- (I) מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0%
- (II) מחסום חלקי דרגה 2 \*10%
- (III) מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES 50%
- (IV) מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת ADAMS STOKES) 100%

(5) הפרעות מסיבות (N.C.A.) NEUROCIRCULATORY ASTHENIA

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנפש.

- (6) גוף זר בלב ובקרום הלב
- (א) ללא הפרעות 0%
- (ב) הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

10. קרום הלב

- (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
- (א) במשך חדשים לאחר ההחלמה 40%
- (ב) לאחר תקופה זו 0%
- (I) התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות
- (II) נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
- (2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.
- (3) CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית
- (א) בהתאם למצב התפקודי של הלב
- (ב) במקרה של ניתוח
- (I) במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%
- (II) לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

11. כלי הדם

(1) דליות VARICES CRURIS

- (א) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0%
- (ב) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים \*\*10%
- (ג) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני ECZEMA וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו \*\*20%
- (ד) ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של ECZEMA (ULCUS VARICOSUM או CRURIS), ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק) \*\*30%
- (ה) המצב כמתואר בסעיף קטן (1) (ד) בשתי הרגליים \*\*40%
- (ו) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב 50%

(2) מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים כגון PHLEBITIS או THROMBOPHLEBITIS או נזק בורידיים

- (א) קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 0%
- (ב) המצב כמתואר בסעיף קטן (2) (א) - בשתי הרגליים \*\*10%
- (ג) קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם PIGMENTATIO וכחלון ברגל אחת \*\*20%
- (ד) המצב כמתואר בסעיף קטן (2) (ג) - בשתי הרגליים \*\*30%

30%	(ה) קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון ECZEMA או כיבים ברגל אחת
40%	(ו) המצב כמתואר בסעיף קטן (2) (ה) בשתי הרגליים
50%	(ז) בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד

**מפרצת - ANEURYSMA (3)**

***10%	(א) של עורק קטן, בלי הפרעות
**20%	(ב) של עורק קטן עם הפרעות קלות
**30%	(ג) של עורק קטן עם הפרעות קשות
40%	(ד) של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם
50%	(ה) של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם
60%	(ו) של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם
60%	(ז) של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של ANEURYSMA כנ"ל
100%	(ח) של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות

**ARTERIO - VENOUS FISTULA (4)**

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).

**M.RAYNAUD ENDARTERITIS OBLITERANS (5)**

( M.BUERGER )

**20%	(א) בצורה קלה ברגל אחת
**30%	(ב) בצורה קלה בשתי הרגליים
40%	(ג) בצורה בינונית ברגל אחת
50%	(ד) בצורה בינונית בשתי הרגליים
60%	(ה) בצורה קשה
100%	(ו) בצורה קשה מאד

**נזקי כפור ברגליים (6)**

**0%	(א) קיימים סימנים קלים בלבד - בועות-כפור (CHILLBLAINS) (
	(ב) קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':
**5%	(I) בגף אחד
**10%	(II) בשני הגפיים
**	(ג) עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות

**12. מערכת העיכול**

**(1) לשון**

	(א) איבוד פחות ממחצית הלשון:
10%	(I) ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה
20%	(II) עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה
	(ב) איבוד מחצית הלשון או יותר מכן:
40%	(I) ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה
60%	(II) עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה

**(2) וישט**

	(א) מיצר STRICTURA של הושט -
30%	(I) בצורה בינונית
50%	(II) בצורה קשה
80%	(III) בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד
	(ב) סעיפי הושט (DIVERTICULUM):
0%	(I) ללא הפרעות או עם הפרעות קלות
10%	(II) הפרעות בינוניות
30%	(III) הפרעות קשות
	(ג) אזופגיטיס (ESOPHAGITIS):
*10%	(I) בצורה קלה
30%	(II) בצורה בינונית

50% (III) בצורה קשה עם שטפי דם חוזרים, אנמיה בולטת

- (ד) קרדיוספזמוס (CARDIOSPASM):  
(I) אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט  
(II) לאחר ניתוח, אין הפרעות  
0% (III) לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.  
(ה) בקע סרעפתי (HERNIA DIAPHRAGMATICA)  
(א) אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.  
(ב) בקע סרעפתי לאחר ניתוח:  
0% (I) אין הפרעות  
(II) קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג

(3) **קיבה**

- (א) דלקת כרונית של הקיבה:  
(I) בצורה קלה ללא הפרעות \*\*0%  
(II) בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון \*\*\*10%  
(III) בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%  
(ב) כיב הקיבה או כיב התריסרון:  
(I) כיב שהתרפא, אין הפרעות 0%  
(II) בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים \*\*\*10%  
(III) בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) \*\*30%  
(IV) בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה 60% ניכרת על המצב הכללי  
(ג) כיב הקיבה או כיב התריסרון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14

13. **מעיים**

(1) **SPASTIC ENTERO-COLITIS CHRONICA INCLUDING AMEBIC COLITIS**

- (א) הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי \*\*0%  
(ב) בצורה בינונית \*\*\*10%  
(2) **דלקת כיבית של המעי הגס**  
(א) בצורה קלה עם 3-4 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי \*10%  
(ב) בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30%  
(ג) בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50%  
(ד) בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד 70%  
(ה) בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100%

(3) **DIVERTICULITIS - DIVERTICULOSIS**

- (א) ללא הפרעות 0%  
(ב) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)

(4) **MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING COELIAC DISEASE, SPRUE**

- (א) בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, 20% בלי אנמיה

- (ב) בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40%  
(ג) בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (HYPOPROTEINEMIA) בצקת 70% ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו'

- (5) **מחלות כגון: CROHN'S DISEASE, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)**

14. **פציעות וניתוחי קיבה ומעיים**

- (1) **מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים**  
(א) ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0%  
(ב) ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב \*\*\*10%  
(ג) ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20%



40%	(ד)	ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד
60%	(ה)	מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא
80%	(ו)	ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד
100%	(ז)	ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד

(2) **נצור קבוע של המעיים**

20%	(א)	ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה
30%	(ב)	ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה
80%	(ג)	ANUS PRAETER NATURALIS

15. פי הטבעת

(1) **FISSURA ANI**

0%	(א)	ללא הפרעות
10%	(ב)	ישנן הפרעות ניכרות

(2) **FISTULA ANI**

10%	(א)	המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות
20%	(ב)	עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (RECIDIVANS) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות

(3) **מצר - (STRICTURA)**

30%	(א)	בצורה בינונית
50%	(ב)	בצורה קשה

(4) **PROLAPSUS MUCOSAE RECTI**

0%	(א)	ללא הפרעות
10%	(ב)	קיימות הפרעות

(5) **PROLAPSUS RECTI TOTALIS**

20%	(א)	ניתן להחזרה
40%	(ב)	קבוע, ישנן הפרעות ניכרות

(6) **איבוד מוחלט של השליטה על השוער (SPHINCTER)**

(7) **טחורים VARICES HAEMORRHOIDALES חיצוניים או פנימיים**

0%	(א)	בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות
10%***	(ב)	בולטים, עם דימומים שכיחים
20%	(ג)	בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון FISSURA ANI או FISTULA ANI בצורה קלה

16. מחלות הכבד ודרכי המרה

(1) **שחמת הכבד**

20%**	(א)	בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד
40%**	(ב)	בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי
70%	(ג)	בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (ASCITES) עם או בלי שטפי דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים
100%	(ד)	בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד

(2) **מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער**

40%	(א)	המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים
70%	(ב)	קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים
100%	(ג)	המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד (PORTAL SYSTEMIC ENCEPHALOPATHIA)

(3) **מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (INFECTIOUS HEPATITIS)**

0%	(א)	לא נשארו הפרעות
	(ב)	ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1).

**ECHINOCOCCUS OF LIVER** (4)

- (א) מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 0%
- (ב) לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0%
- (ג) נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.
- (ד) פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1).

**מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד (ABSCESS OF LIVER)** (5)

- (א) אין הפרעות 0%
- (ב) נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק

**דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה** (6)

- (א) ללא הפרעות 0%
- (ב) בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול \*\*\*10%
- (ג) בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות \*\*20%
- (ד) בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או צהבת, עם הפרעה 40% ניכרת במצב הכללי

**מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה** (7)

- (א) ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0%
- (ב) קיימות הפרעות בינוניות \*\*\*10%
- (ג) POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME בצורה בולטת \*\*20%
- (ד) הופעות חוזרות של CHOLANGITIS עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%

**17. טחול**

- (א) הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 0%
- (ב) מצב לאחר כריתת הטחול \*\*\*10%
- (ג) הגדלה ניכרת של הטחול HYPERSPLENISM עם הפרעות במערכת הדם 30% המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבופניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות

**18. צפק**

**התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל** (1)

- הבטן**
- (א) ישנן הפרעות נדירות וקלות 0%
- (ב) ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס \*\*\*10%
- (ג) ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות \*\*20%
- (ד) ישנן הפרעות קשות 30%
- שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (SUB-ILEUS)** (2)
- (א) בשלב הפעיל 100%
- (ב) במצב לאחר השלב החרף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף קטן (1).

**19. בקע**

- (א) בקע המפשעה הניתן להחזרה (REPONIBILIS) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות \*\*0%
- (ב) מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות \*\*0%
- (ג) בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (REPONIBILIS) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה \*\*10%
- (ד) מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי \*\*15%
- (ה) בקע חוזר (RECIDIVANS) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה \*\*10%
- (ו) מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי \*\*15%
- (ז) בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (IRREPONIBILIS) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי \*\*20%
- (ח) מצב כמתואר בסעיף קטן (ז) עם הפרעות ניכרות \*\*30%

- (ט) בקע פמורלי (HERNIA FEMORALIS) - אחווי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו \*\*  
 לגבי בקע במפשעה (HERNIA INGUINALIS)

**20. פציעות ובקעים של קיר הבטן**

- (א) מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0%  
 (ב) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית \*\*10%  
 (ג) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית \*\*20%  
 (ד) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם EVENTRATIO גדולה 40%  
 (ה) HERNIA LINEAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS קטנות וללא הפרעות 0%  
 (ו) HERNIA LINEAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS יותר גדולות \*\*\*10%  
 או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות

**21. גידולים**

גידולים ממאירים ושפירים אחווי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים.

**פרק שני: המערכת האורו-גניטלית**

**22. כליות**

- (1) **צניחת הכליות (PTOSIS או כליה נודדת (REN MIGRANS))**  
 (א) ללא הפרעות 0%  
 (ב) ישנן הפרעות - ייקבעו אחווי הנכות בהתאם לפגימות
- (2) **כליה בצורת פרסה (HORSE SHOE KIDNEY)**  
 (א) ללא סיבוכים 0%  
 (ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחווי הנכות בהתאם לפגימות
- (3) **כריתה חלקית של כליה אחת**  
 (א) ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה \*\*\*10%  
 (ב) קיימים סיבוכים - ייקבעו אחווי הנכות בהתאם לפגימות \*\*
- (4) **כריתת כליה**  
 (א) כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה \*\*\*30%  
 (ב) כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה 60%  
 (ג) כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב 100%
- (5) **כליה שאינה פועלת (NON FUNCTIONING KIDNEY)**  
 (א) אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה \*\*\*30%  
 (ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחווי הנכות בהתאם לסיבוכים.
- (6) **הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית**  
 (א) ORTHOSTATIC ALBUMINURIA \*\*0%  
 (ב) מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות \*\*\*10%
- (7) **דלקת כליות כרונית**  
 (א) הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא UREMIA \*\*20%  
 (ב) כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא UREMIA \*\*\*30%  
 (ג) תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה 50% (UREA) בדם עד 50 מג"ר אחוז  
 (ד) תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (UREA) בין 50 ל-80% 80-80 מג"ר אחוז  
 (ה) עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100%
- (8) **PYELONEPHRITIS CHRONICA אחווי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).**

- (9) **אבני הכליות**
- (א) אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה 10%\*\*\* במצב הכללי
- (ב) אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20%\*\*
- (ג) אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השנייה 40%\*\*
- (ד) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20%\*\*
- (ה) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40%
- (ו) מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 0%
- קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10).

- (10) **HYDRONEPHROSIS**
- (א) אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות 0%
- (ב) בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת 10%\*\*\*
- (ג) בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת 30%\*\*
- (ד) עם זיהום או PYONEPHROSIS 50%
- (11) **ESSENTIAL HAEMATURIA המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית** 10%\*\*\*

**23. שלפוחית השתן ודרכי השתן**

- (1) **אורטר**
- אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).
- (2) **שלפוחית השתן**
- (א) דלקת כרונית של שלפוחית השתן
- (I) דלקת קלה, ללא הפרעות 0%
- (II) דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10%
- (III) דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות 20%
- (IV) דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 50%
- (V) אי שליטה או אי עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים 70%
- (ב) דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית (HUNNER'S ULCER) 60%
- (ג) אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן 2(א).
- (ד) ניצור השלפוחית FISTULA VESICAE 50%

- (3) **שופכה**
- (א) היצרות השופכה (URETRA):
- (I) בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות (-2) 10%\*  
1 פעמים לשנה)
- (II) המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים 20%
- (III) המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית 30%
- (ב) ניצור בשופכה:
- (I) בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין 20%
- (II) בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחומרי חבישה 40%
- (III) בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה 70%
- (IV) ניצורים רבים ב-PERINEUM 100%

**24. אשכים ואבר המין של הזכר**

- (1) **VARICOCELE**
- (א) חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות 0%\*\*\*

- (ב) עם הפרעות ניכרות  
**HYDROCOELE** חד או דו-צדדי (2)  
 \*\*0%  
 חוסר אשך אחד והשני תקין (3)  
 \*\*\*20%  
 אבדן שני האשכים (4)  
 (א) אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות  
 \*\*50%  
 (ב) אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות  
 \*\*40%  
 (ג) מעל לגיל 60  
 \*\*\*25%  
**אבדן חלקי של ה-PENIS** (5)  
 \*\*\*30%  
**אבדן של ה-PENIS** (6)  
 \*\*60%  
**אספרמיה חבלתית** (7)  
 (א) עד גיל 45  
 \*\*\*20%  
 (ב) מעל לגיל 45  
 \*\*\*10%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.

## 25. אברי המין של האשה

- (1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה  
 (א) ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 0%  
 (ב) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון \*\*10%  
 (ג) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20%
- (2) מצב לאחר כריתת שחלות  
 (א) כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השנייה \*\*\*10%  
 (ב) כריתה של שתי השחלות:  
 (I) עד גיל 50  
 (II) אחרי גיל 50  
 \*\*\*40%  
 \*\*\*20%
- (3) מצב לאחר כריתת הרחם  
 (א) עד גיל 50 \*\*\*40%  
 (ב) אחרי גיל 50 \*\*\*20%
- (4) מצב לאחר PANHYSTERECTOMY  
 (א) עד גיל 50 \*\*\*50%  
 (ב) אחרי גיל 50 \*\*\*30%
- (5) צניחת הנרתיק והרחם (PROLAPSUS VAGINAE ET UTERI)  
 (א) ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (FISTULA VESICO-GENIT) 50%  
 (ב) ניצור בין החלחלה ואברי המין (FISTULA RECTO-GENIT) 50%  
 (6) ניצורים של אברי המין של האשה  
 (א) ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (FISTULA VESICO-GENIT) 50%  
 (ב) ניצור בין החלחלה ואברי המין (FISTULA RECTO-GENIT) 50%  
 לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

## 26. שחפת אורוגניטלית

- (א) בתקופה החריפה והפעילה 100%  
 (ב) שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין 60%  
 (ג) שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%  
 (ד) שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות \*10%

## 27. עקרות

### עקרות

- (א) כשגורמיה אינם ברורים \*\*\*30%  
 (ב) כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות \*\*\*

## 28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים

- (א) שד אחד

**30%	(I)	עד לגיל 30 שנה
**25%	(II)	מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה
**15%	(III)	מעל לגיל 45 שנה
	<b>שני השניים</b> (ב)	
**50%	(I)	עד גיל 30 שנה
**40%	(II)	מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה
**30%	(III)	מעל לגיל 45 שנה

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגמה

## פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

### 29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

	(1)	המיפלגיה (HEMIPLEGIA)
	(א)	חלקית
<u>שמאל</u>		
20%	30%	(I) בצורה קלה
40%	50%	(II) בצורה בינונית
60%	70%	(III) בצורה קשה
100%	100%	(ב) שלמה עם קונטרקטורות
		בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.
	(2)	פרפלגיה (PARAPLEGIA)
	(א)	בצורה קלה
20%		(ב) בצורה בינונית
50%		(ג) בצורה קשה
80%		(ד) בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת)
100%		
	(3)	QUADRIPLEGIA
	(א)	בצורה קלה
60%		(ב) בצורה בינונית
80%		(ג) בצורה קשה
100%		
	(4)	בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
	(4)	MONOPLÉGIA
		אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.
	(5)	פגימות בעצבי המוח
	(א)	עצב V (TRIGEMINUS)
	(I)	בצורה קלה
***10%		(II) בצורה בינונית
**20%		(III) בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ניכרות
**30%		(IV) בצורה קשה
**40%		
	(ב)	עצב VII (FACIALIS)
	(I)	בצורה קלה
**0%		(II) בצורה בינונית
**10%		(III) בצורה קשה
**30%		
	(ג)	עצב X (VAGUS)
	(I)	בצורה קלה מאוד
**0%		(II) בצורה קלה
**10%		(III) בצורה בינונית
**20%		
	(ד)	עצב XI (ACCESSORIUS)
	(I)	בצורה קלה
**0%		(II) בצורה בינונית
**10%		(III) בצורה קשה
**20%		

(ה) עצב XII (HYPOGLOSSUS)

**10%	(I) בצורה קלה
**30%	(II) בצורה בינונית
**40%	(III) בצורה קשה

NEURITIS (6)

**0%	(I) בצורה קלה
**10%	(II) בצורה בינונית
30%	(III) בצורה ניכרת
50%	(IV) בצורה קשה

APHASIA (7)

	(א) אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד
**10%	(I) בצורה קלה
**20%	(II) בצורה בינונית
40%	(III) בצורה קשה
	(ב) אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)
60%	(I) עם אפשרות של תקשורת עם הזולת
100%	(II) ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי

(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות כגון: ATHETOSIS, CHOREO-ATHETOSIS, CHOREA

20%	30%	(I) בצורה קלה
30%	40%	(II) בצורה בינונית
40%	50%	(III) בצורה קשה

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.

(9) מחלת פרקינסון (MORBUS PARKINSON) חצי גוף

20%	30%	(I) בצורה קלה
30%	40%	(II) בצורה בינונית
40%	50%	(III) בצורה קשה
		(ב) גף עליון בלבד
10%	20%	(I) בצורה קלה
20%	30%	(II) בצורה בינונית
30%	40%	(III) בצורה קשה
		(ג) גף תחתון בלבד
10%	10%	(I) בצורה קלה
20%	20%	(II) בצורה בינונית
30%	30%	(III) בצורה קשה

TIC (10)

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונורוזיס.

(11) אנצפלופטיה (ENCEPHALOPATHIA) (CHRONIC POST) (TRAUMATIC BRAIN SYNDROME)

בהפרעות הנורולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות וכדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

30. הפרעות פרכוסיות

(1) כפיון (GRAND MAL) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:

0%	(א) לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים
10%	(ב) בצורה קלה - היו 1-4 התקפים במשך שנתיים
30%	(ג) בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-3-4 חדשים
50%	(ד) בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים
80%	(ה) בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש
100%	(ו) בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש

**(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות**

פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים (א)1 עד (ה)1(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.

**(3) התקפים ליליים בלבד**

הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.

**(4) כפיון פסיכומטורי**

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של הפרעות הבלתי פרכוסיות.

**(5) (PETIT MAL) MINOR SEIZURES**

התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (ABSENCE) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב רוח, בזכירה וכדומה)

0%	(I) לא היו התקפים במשך שנתיים
	(II) היו בממוצע מדי חודש בחודשו
10%	(א) בצורה קלה - לא יותר משני התקפים
20%	(ב) בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4
40%	(ג) בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים
60%	(ד) בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע
100%	(ה) בצורה קשה מאד - מצבי סטטוס חוזרים

**(6) התקפים ג'קסוניים (JACKSONIAN) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.**

**31. עצבי הגפיים העליונים**

שמאל	ימין	קבוצת השרשים (RADICULAR GROUP) העליונה או האמצעית או התחתונה	(1)
			(א) שיתוק חלקי
10%	20%	(I) בצורה קלה	(1)
30%	40%	(II) בצורה בינונית	(2)
40%	50%	(III) בצורה קשה	(3)
60%	70%	(ב) שיתוק מלא	(4)
		כל קבוצת השרשים (PLEXUS)	(2)
		(א) שיתוק חלקי	(1)
10%	20%	(I) בצורה קלה	(1)
30%	40%	(II) בצורה בינונית	(2)
50%	60%	(III) בצורה קשה	(3)
70%	80%	(ב) שיתוק מלא	(4)
		<b>RADIALIS</b> עצב	(3)
		(א) שיתוק חלקי	(1)
10%	20%	(I) בצורה קלה	(1)
20%	30%	(II) בצורה בינונית	(2)
30%	40%	(III) בצורה קשה	(3)
50%	60%	(ב) שיתוק מלא	(4)
		<b>MEDIANUS</b> עצב	(4)
		(א) שיתוק חלקי	(1)



5%	5%	(I) בצורה קלה מאוד
10%	10%	(II) בצורה קלה
20%	30%	(III) בצורה בינונית
30%	40%	(IV) בצורה קשה
50%	60%	(ב) שיתוק מלא

**שיתוק עצב ULNARIS (5)**

		(א) שיתוק חלקי
0%	0%	(I) בצורה קלה מאוד
5%	5%	(II) בצורה קלה
10%	20%	(III) בצורה בינונית
20%	30%	(IV) בצורה קשה
40%	50%	(ב) שיתוק מלא

**שיתוק עצב CIRCUMFLEXUS HUMERI או MUSCULO-CUTANEUS (6)**

		(א) שיתוק חלקי
0%	0%	(I) בצורה קלה
10%	10%	(II) בצורה בינונית
10%	20%	(III) בצורה קשה
20%	30%	(ב) שיתוק מלא

**שיתוק עצב THORACALIS LONGUS (7)**

		(א) שיתוק חלקי
0%	0%	(I) בצורה קלה או בינונית
10%	10%	(II) בצורה קשה
10%	20%	(ב) שיתוק מלא

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

**32. עצבי הגפיים התחתונים**

**(1) (SCIATIC NERVE)N. ISCHIADICUS**

		(א) שיתוק חלקי
10%		(I) בצורה קלה
20%		(II) בצורה בינונית
40%		(III) בצורה קשה
60%		(ב) שיתוק מלא

**(2) - N. POPLITEUS EXTERNUS (COMMON PERONEAL NERVE)**

		(א) שיתוק חלקי
10%		(I) בצורה קלה
10%		(II) בצורה בינונית
20%		(III) בצורה קשה

**(3) N. MUSCULO-CUTANEUS (SUPERFICIAL PERONEAL NERVE)**

		(א) שיתוק חלקי
0%		(I) בצורה קלה או בינונית
10%		(II) בצורה קשה
20%		(ב) שיתוק מלא

**(4) N. TIBIALIS ANTERIOR (DEEP PERONEAL NERVE)**

		(א) שיתוק חלקי
0%		(I) בצורה קלה
10%		(II) בצורה בינונית
20%		(III) בצורה קשה
30%		(ב) שיתוק מלא

		<b>(TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR</b>	(5)
		(א) שיתוק חלקי	
10%		(I) בצורה קלה	
10%		(II) בצורה בינונית	
20%		(III) בצורה קשה	
20%		(ב) שיתוק מלא	
		<b>N. FEMORALIS OR N. CRURALIS</b>	(6)
		(א) שיתוק חלקי	
10%		(I) בצורה קלה או בינונית	
20%		(II) בצורה קשה	
30%		(ב) שיתוק מלא	

### פרק רביעי: הפרעות פסיכוטיות ופסיכונירוטיות

#### 33. הפרעות פסיכוטיות

#### PSYCHOTIC DISORDERS

בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

10%	(א)	מצבי REMISSIO שלמה או מצבי REMISSIO המלווים סימנים בלתי ניכרים של חוסר התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה ו-ADAPTIO סוציאלית.
20%	(ב)	מצבי REMISSIO המלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה
30%	(ג)	מצבי REMISSIO המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה
50%	(ד)	מצבי REMISSIO חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה
70%	(ה)	סימנים אופייניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה
100%	(ו)	חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת

#### 34. הפרעות פסיכונירוטיות

0%	(א)	ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל
10%	(ב)	ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה
20%	(ג)	ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה
30%	(ד)	ישנם סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה
50%	(ה)	ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר
70%	(ו)	מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכויים והמלווים בחוסר התאמה סוציאלית
100%	(ז)	מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכויים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות

### פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

#### 35. מחלות העצמות והפרקים

	(1)	<b>ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר</b>
0%	(א)	אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות

10%	(ב) קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות
20%	(ג) קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה
30%	(ד) ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות
50%	(ה) בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד
80%	(ו) בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד
100%	(ז) בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים

### (2) OSTEOMYELITIS CHRONICA

	(א) ישנו גת (SINUS) מפריש, תמידי
10%	(I) אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות
20%	(II) אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה
30%	(ב) ישנם SEQUESTER והפרשה מוגבלת
50%	(ג) הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים
100%	(ד) הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה

### (3) שחפת העצמות והפרקים

	(א) בתקופה החריפה של המחלה
50%	(I) בצורה קלה או בינונית
70%	(II) בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה
100%	(III) בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית
	(ב) לאחר חילוף התקופה החריפה
30%	(I) הטיפול נמשך, אין סימני פעילות
50%	(II) הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות
	(ג) מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים

### 36. גולגולת

	(1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו
0%	(א) אין הפרעות אובייקטיביות
	(ב) ישנן הפרעות אובייקטיביות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנורולוגיות.
	(2) חסר בעצמות הגולגולת
*5%	(א) עד שלושה סנטימטרים מרובעים
*10%	(ב) מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים
*20%	(ג) מעל ל-5 ועד ל-10 סנטימטרים מרובעים
	(ד) ביותר מ-10 סנטימטרים מרובעים
30%	(I) ללא HERNIA CEREBRI
80%	(II) ישנה HERNIA CEREBRI
	(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן (2).
	(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך גולגולתיים המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

### 37. עמוד השדרה

	(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (CERVICAL ANKYLOSIS)
30%	(א) בזווית נוחה
50%	(ב) בזווית בלתי נוחה
	זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה;
	זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
	(2) קבוע עמוד השדרה הגבי (DORSAL ANKYLOSIS)
10%	(א) בזווית נוחה
30%	(ב) בזווית בלתי נוחה
	זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפויס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-

- (3) **קבוע עמוד השדרה המתני (LUMBAR ANKYLOSIS)**
- 30% (א) במצב נוח  
40% (ב) במצב בלתי נוח  
50% (ג) במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה  
מצב נוח - שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;  
מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גס ביציבה.
- (4) **קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה**
- 60% (א) בזווית נוחה  
100% (ב) בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר  
זווית העולה על 30° לגבי הקו המאונך (VERTICAL) נחשבת לבלתי נוחה.
- (5) **הגבלת תנועות בעמוד השדרה הצוארי (CERVICAL SPINE)**
- 10% (א) בצורה קלה  
20% (ב) בצורה בינונית  
30% (ג) בצורה קשה  
30% (ד) אי יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה על ידי צילומי רנטגן בתנוחות שונות
- (6) **הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (DORSAL SPINE)**
- 0% (א) בצורה קלה  
10% (ב) בצורה בינונית או קשה
- (7) **הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (LUMBAR SPINE)**
- 10% (א) בצורה קלה  
20% (ב) בצורה בינונית  
30% (ג) בצורה קשה
- (8) **שבר של גוף חוליה שהתרפא**
- \*5% (א) בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו  
10% (ב) עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו  
20% (ג) עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו
- (9) **הפרעות לאחר שבר של PROCESSUS SPINOSUS עם או בלי ה-TRANSVERSUS שלא התחבר**
- (10) **תסמונת של בקע הדיסקוס (HERNIA DISCI SYNDROME)**
- 0% (א) שהתרפאה  
(ב) כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.

### 38. בית החזה<sup>3</sup>

- (1) **שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח**
- 0% (א) השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב  
(ב) מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות - אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:
- אין נכות (1) לאחר שבר בצלעות שהתרפא  
0% (2) לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים

<sup>3</sup> פרט 38(1)(ב) - בנוסח המקורי:

"שינוי צורה לאחר כריתת צלעות - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 7, סעיף קטן (4)".

בק"ת 5856, התשנ"ה, עמ' 2, ת"ת 12.10.97, הוחלף לנוסח דלעיל.

פרט 38(1)(ב)(4) - הניפוץ לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוץ יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

0%	(3) לאחר כריתת צלע אחת
*10%	(4) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד
20%	(5) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד
30%	(6) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד
50%	(7) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד
	<b>פציעת שרירי בית החזה (2)</b>
10%	(א) בצורה בינונית
20%	(ב) בצורה קשה

### 39. עצם הבריה ועצם השכם

0%	(1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריה או עצם השכם
10%	(2) אי-התאחות (NON UNION) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריה
*5%	(3) נקע של עצם הבריה (ACROMIO-CLAVICULAR DISLOCATION) ללא הגבלה בתנועות
*5%	(4) STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (ANTERIOR)
20%	(5) STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (POSTERIOR)

### 40. עצמות הגפיים העליונים

שמאל	ימין	
10%	20%	(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (HUMERUS), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית
20%	30%	(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה
20%	30%	(3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון FIBROUS (UNION)
40%	50%	(4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (FLAIL JOINT) FLASH
35%	40%	(5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (RADIUS ET ULNA) עם התהוות פרק נד מדומה
15%	20%	(6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי-התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת
20%	30%	(7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת
10%	10%	(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון
15%	20%	(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון
5%	10%	(10) חיבור גרוע של האולנה (ULNA)
10%	10%	(11) חיבור גרוע של הרדיוס (RADIUS)
		<b>אבדן גף עליון (12)</b>
70%	80%	(א) בפרק הכתף
65%	75%	(ב) מעל מקום החיבור M. DELTOIDEUS
60%	70%	(ג) מתחת למקום החיבור M. DELTOIDEUS
		<b>אבדן האמה (13)</b>
55%	65%	(א) מעל מקום החיבור הרדיאלי של M. PRONATOR TERES
50%	60%	(ב) מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. PRONATOR TERES
50%	60%	<b>אבדן היד בשורש (14)</b>
50%	55%	<b>אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד (15)</b>

gif.dargat\_nehoot\_1

gif.dargat\_nehoot\_2

### 41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

שמאל	ימין	(1) נקיעה חוזרת של הכתף (RECURRENT HUMERO- SCAPULAR DISLOCATION)
20%	20%	(א) נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם

20%	30%	(ב) נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה
30%	40%	(ג) נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית
*5%	*5%	(ד) לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה
40%	50%	(2) מפרק נד של הכתף (FLAIL SHOULDER)
שמאל	ימין	(3) קשיון (ANKYLOSIS) של פרק הכתף
25%	30%	(א) קשיון נוח
40%	50%	(ב) קשיון לא נוח
		בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של $45^{\circ}$ - $50^{\circ}$ מהגוף בתנוחת מה קדימה
		בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של $25^{\circ}$ מהגוף או בריחוק מעבר ל- $60^{\circ}$
		(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף
0%	0%	(א) מעל לגובה השכם
15%	15%	(ב) עד לגובה השכם
25%	25%	(ג) עד $45^{\circ}$ מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה
35%	35%	(ד) עד $30^{\circ}$ מהגוף
		(5) <b>פרק המרפק</b>
0%	0%	(א) מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות
10%	10%	(ב) מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VARUS CUBITUS VALGUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות
		(6) <b>קשיון במרפק</b>
20%	30%	(א) קשיון נוח
30%	40%	(ב) קשיון לא נוח
		קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין $70^{\circ}$ עד $90^{\circ}$ (ראה ציור מס' 1)
		ובעמדה אמצעית של האמה;
		קשיון לא-נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO).

gif.dargat\_nechoot\_3

		(7) <b>הגבלת התנועות במרפק</b>
<u>שמאל</u>	<u>ימין</u>	(א) הגבלות בכיפוף קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ- $25^{\circ}$ והכיפוף אפשרי:
30%	40%	(I) מ- $0^{\circ}$ עד $35^{\circ}$
20%	30%	(II) מ- $0^{\circ}$ עד $60^{\circ}$
10%	15%	(III) מ- $0^{\circ}$ עד $90^{\circ}$
0%	0%	(IV) מ- $0^{\circ}$ עד $150^{\circ}$
		(ב) הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ- $150^{\circ}$ עד ל- $90^{\circ}$ והיישור אפשרי עד לתנוחה.
30%	40%	(I) של $90^{\circ}$
10%	15%	(II) של $60^{\circ}$
10%	10%	(III) של $30^{\circ}$
0%	0%	(IV) מ- $0^{\circ}$ עד $150^{\circ}$
		(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המרפק.
30%	40%	(9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW)
		(10) שורש היד

0%	0%	(א) מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות
15%	20%	(ב) קשיון נוה
30%	40%	(ג) קשיון לא נוה
20%	30%	(ד) קשיון בעמדה בינונית, בין נוה ובין לא נוה קשיון נוה - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 15°-25° ובאבדוקציה אולגריית או נויטרלית.
		קשיון לא נוה - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
5%	10%	(ה) הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 15°
20%	30%	(ו) איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של SUPINATIO או HYPERPRONATIO
10%	20%	(ז) איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO או הגבלת תנועותיהם במצב נוה ובמצב של PRONATIO בעמדה נויטרלית
		הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID; LUNATO- MALACIA ETC; - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

gif.dargat\_nehoot\_4

42. שרירי הגפיים העליונים

(1) פציעת שרירי הכתף

<u>שמצל</u>	<u>ימין</u>	
		TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS (א)
		LEVATOR SCAPULAE
10%	10%	(I) בצורה בינונית
10%	20%	(II) בצורה ניכרת
20%	30%	(III) בצורה קשה
		PECTORALIS MAJOR, MINOR, (ב)
		LATISSIMUS DORSI, TERES MAJOR
10%	10%	(I) בצורה בינונית
20%	20%	(II) בצורה ניכרת
30%	30%	(III) בצורה קשה
		DELTOIDEUS (ג)
10%	20%	(I) בצורה בינונית
20%	30%	(II) בצורה ניכרת
30%	40%	(III) בצורה קשה
		SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, (ד)
		SUBSCAPULARIS, CORACOBRACHIALIS
10%	10%	(I) בצורה בינונית
10%	20%	(II) בצורה ניכרת
20%	30%	(III) בצורה קשה

(2) פציעת שרירי המרפק

		BICEPS, BRACHIALIS, BRACHIORADIALIS (א)
10%	10%	(I) בצורה בינונית
20%	20%	(II) בצורה ניכרת
30%	30%	(III) בצורה קשה
		TRICEPS, ANCONEUS (ב)
10%	10%	(I) בצורה בינונית
20%	20%	(II) בצורה ניכרת
30%	30%	(III) בצורה קשה
		FLEXOR CARPI, DIGITI (ג)
10%	10%	(I) בצורה בינונית
10%	20%	(II) בצורה ניכרת
20%	30%	(III) בצורה קשה
		EXTENSOR CARPI, DIGITI (ד)

0%	10%	(I)	בצורה בינונית
10%	10%	(II)	בצורה ניכרת
10%	20%	(III)	בצורה קשה

#### אצבעות הידיים

#### 43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

שמאל	ימין	אגודל	(1)
20%	25%	(א) קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה	
15%	20%	(ב) קטיעת שני גלילים או גליל וחצי	
10%	15%	(ג) קטיעת הגליל הסופי	
8%	8%	(ד) קטיעת חצי הגליל הסופי	
		אצבע 2	(2)
12%	15%	(א) קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה	
10%	12%	(ב) קטיעת לפחות 2 ½ גלילים	
10%	10%	(ג) קטיעת 2 או 1 ½ גלילים	
5%	5%	(ד) קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו	
		אצבע 3	(3)
12%	15%	(א) קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה	
10%	12%	(ב) קטיעת לפחות 2 ½ גלילים	
10%	10%	(ג) קטיעת 2 או 1 ½ גלילים	
5%	5%	(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו	
		אצבע 4 או אצבע 5	(4)
10%	10%	(א) קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה	
8%	10%	(ב) קטיעת לפחות 2 ½ גלילים	
5%	8%	(ג) קטיעת 2 או 1 ½ גלילים	
5%	5%	(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו	

#### 44. קשיון אצבעות היד

קשיון לא נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;

קשיון לא נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה;

קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (-) (PINCH)

שמאל	ימין	(1)	קשיון לא נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק.
10%	10%	(2)	קשיון נוח של האגודל
7%	7%	(3)	קשיון נוח של אצבע 2
5%	5%	(4)	קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5

#### 45. Mallet Finger

7%	(1)	של האגודל או של אצבע 2
5%	(2)	של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע

בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 45,44,43.

#### 46. האגן

שינוי צורת האגן:



- (1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות  
 (2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.  
 (3) SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA 25% והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה

#### 47. עצמות הגפיים התחתונים

- (1) **אי התאחות של עצם ה-FEMUR**  
 (א) הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%  
 (ב) מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%  
 (2) **חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA)**  
 (א) ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%  
 (ב) עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה לעניין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירוש - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים  
 (3) **אי התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת** 30%

- (4) **אי התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות**

- (א) בצורה קלה 0%  
 (ב) בצורה בינונית 10%  
 (ג) בצורה קשה 20%  
 (ד) בצורה קשה מאוד 30%  
 (5) **התקצרות של רגל אחת**  
 (א) עד 2 סנטימטרים 0%  
 (ב) מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים \*5%  
 (ג) מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים 10%  
 (ד) מעל ל-5 ועד 7.5 סנטימטרים 20%  
 (ה) מעל ל-7.5 סנטימטרים 40%

- (6) **קטיעת הגף התחתון**

- (א) בפרק הירך 80%  
 (ב) בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%  
 (ג) באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%  
 (7) **קטיעת השוק**  
 (א) עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%  
 (ב) ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל SYME'S AMPUTATION 50%

#### 48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

- (1) **פרק הירך**  
 (א) מפרק נד 70%  
 (ב) קשיון לא נוח 50%  
 (ג) קשיון נוח 40%  
 לעניין זה, קשיון נוח, - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-20° עד 30°, האבדוקציה היא מ-0° עד 10°, הרוטציה - נויטרלית.

gif.dargat\_nechoot\_5

- (ד) הגבלה במתיחה (EXTENSIO): הגף איבד התנועות בזווית מ-0° עד 15° 15%  
 (ה) הגבלה בכיפוף המפריעה לשיבה 20%  
 (ו) הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב (ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) 20%

30%	של הגוף	(ז) הגבלה בינונית בכל התנועות
	<b>הברך</b>	(2)
30%	אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד)	(א)
20%	אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף	(ב)
30%	קשיון נוה	(ג)
50%	קשיון לא נוה	(ד)
	קשיון לא-נוה - פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-10° (RECURVATUM) או כיפוף ביותר מ-30° או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-20°	
	<b>הגבלת תנועות הכיפוף</b>	(ה)
0%	(I) הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 90°	
*5%	(II) הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 70°	
10%	(III) הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 45°	
20%	(IV) הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 30°	
30%	(V) הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 15°	
	<b>הגבלה ביישור הברך</b>	(ו)
0%	(I) יישור הברך אפשרי עד 5°	
10%	(II) יישור הברך אפשרי עד 10°	
20%	(III) יישור הברך אפשרי עד 15°	
40%	(IV) יישור הברך אפשרי עד 30°	
50%	(V) יישור הברך אפשרי עד 45°	

gif.dargat\_nechoot\_6

	<b>נזק במניסקוס</b>	(ז)
10%	(I) נזק במניסקוס בצורה קלה	
20%	(II) נזק במניסקוס עם LOCKING	
0%	(III) מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות	
10%	(IV) מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים	
	<b>קרסול</b>	(3)
10%	(א) הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול	
20%	(ב) קשיון נוה	
30%	(ג) קשיון לא נוה	

#### 49. כף הרגל

	<b>רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS חז או דו-צדדית</b>	(1)
0%	(א) בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ שרירים	
10%	(ב) בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס	
20%	(ג) בצורה קשה - קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים	
	<b>PES CAVUS חז או דו-צדדית</b>	(2)
0%	(א) בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות	
10%	(ב) עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל	
15%	(ג) הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים	
20%	(ד) בצורה קשה מאד	
30%	(ה) TALIPES CAVOVARUS קשה	
20%	(ו) הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל: SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם דפורמציה או כאבים	
10%	(3) קשיון נוה של פרקי ה-TARSUS כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS	
10%	(4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבת	
30%	(5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS	
25%	(6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרוזיס בתנוחה נוחה	

25% **TRANSMETATARSAL קטיעה (7)**

**50. אצבעות הרגל**

**(1) קטיעת האצבעות:**

	(א) של כל האצבעות	
25%	(I) עם ראשי ה-METATARSALIA	
15%	(II) בלי ראשי ה-METATARSALIA	
	(ב) של אצבע 1	
20%	(I) עם ראש ה-METATARSUS	
*10%	(II) בלי ראש ה-METATARSUS	
	(ג) של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן	
10%	(I) עם ראש ה-METATARSUS	
*5%	(II) בלי ראש ה-METATARSUS	
	(ד) של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן	
15%	(I) עם ראש ה-METATARSUS	
*10%	(II) בלי ראש ה-METATARSUS	
*5%	<b>HALLUX VALGUS חז-צדדית קשה (2)</b>	
10%	<b>HALLUX RIGIDUS חז צדדית קשה (3)</b>	
	<b>אצבע פטיש (4)</b>	
0%	(א) אצבע בודדת	
*10%	(ב) בכל האצבעות, חז-צדדית ומבלי PES CAVUS	
10%	(5) <b>המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS</b>	
*5%	(6) <b>מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS</b>	

**51. שרירי הגפיים התחתונים**

**(1) פציעת קבוצת השרירים,**

**PYRIFORMIS, GEMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM.**

10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
30%	(ג) בצורה קשה	
	<b>GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS (2)</b>	
20%	(א) בצורה בינונית	
30%	(ב) בצורה ניכרת	
50%	(ג) בצורה קשה	
	<b>ILLIO-PSOAS, PECTINEUS (3)</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
30%	(ג) בצורה קשה	
	<b>ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS (4)</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
30%	(ג) בצורה קשה	
	<b>SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS, INTERMEDIUS-INTERNUS, TENSOR FASCIAE LATAE (5)</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
30%	(ג) בצורה קשה	
	<b>SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS (6)</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	

30%	(ג) בצורה קשה	(7)
	<b>TIBIALIS ANTERIOR, EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TERTIUS</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
10%	(ב) בצורה ניכרת	
20%	(ג) בצורה קשה	(8)
	<b>TRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR, PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUCIS LONGUS, FLEXOR DIGIT, LONGUS, POPLITEUS</b>	
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
20%	(ג) בצורה קשה	
	<b>EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT, BREVIS, INTEROSSEI</b>	(9)
10%	(א) בצורה בינונית	
10%	(ב) בצורה ניכרת	
20%	(ג) בצורה קשה	
	<b>FLEXOR DIGIT, BREVIS, ABDUCTOR HALLUCIS, QUADRATUS PLANTAE, ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR HALLUCIS</b>	(10)
10%	(א) בצורה בינונית	
20%	(ב) בצורה ניכרת	
30%	(ג) בצורה קשה	

#### פרק שישי: ליקויי ראייה, פציעות ומחלות עיניים<sup>4</sup>

52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה<sup>5</sup>  
(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)

א ב ג ד ה ו ז ח ט י

<sup>4</sup> הפריטים 52(1) - 52(2) אינם מובאים בחשבון לענין קצבת נכות כללית כאשר אחוז הנכות מכל סעיף בנפרד או מצירוף שני הסעיפים אינו עולה על 25%. אלא אם כן חדות הראייה באחת העיניים היא 3/60. ולענין שירותים מיוחדים כאשר אחוז הליקוי מכל סעיף בנפרד או מצירוף שני הסעיפים אינו עולה על 50%.

הערה - הפריטים בפרק השישי הוחלפו בק"ת 5461, התשנ"ב, עמ' 1403, לנוסח דלעיל.

תחילתו של תיקון זה 30 ימים מיום 26.7.92 והוא יחול גם לגבי מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

הואיל וטרם תוקנו התקנות הקובעות פריטים מנופים לענין שירותים מיוחדים לא סומנו ליד סעיפי הליקוי הפריטים המנופים בפרק זה.

בק"ת 5516, התשנ"ג, עמ' 764, פורסם תיקון טעות המבטל בדיעבד את ההערה לטבלה שפורסמה בק"ת התשנ"ב עמ' 1403, וכן תיקוני עריכה נוספים בפרק זה.

<sup>5</sup> פרט 52(1) - בק"ת 5737, התשנ"ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום 22.2.96, בפרט (4) בטור י' במקום "40" בא "45" ובפרט (9) בטור ג' במקום "30" בא "35".

בפרט 52(1) - 52(2) הפרט מנופה כאשר אחוז הנכות מכל סעיף או מצירוף שני הסעיפים אינו עולה על 25% אלא אם חדות הראייה באחת העיניים היא 3/60.

NLP	1/60	3/60	6/60	6/30 6/36	6/21 6/24	6/15 6/18	6/12	6/9	6/6	חדות הראיה	
30	30	25	20	15	10	10	0	0	0	6/6	1
30	30	25	20	15	10	10	5	0	0	6/9	2
40	35	30	25	20	15	15	10	5	0	6/12	3
45	40	35	30	30	25	20	15	10	10	6/15	4
										6/18	
55	50	45	40	40	30	25	15	10	10	6/21	5
										6/24	
70	65	60	55	50	40	30	20	15	15	6/30	6
										6/36	
90	80	75	70	55	40	30	25	20	20	6/60	7
95	90	90	75	60	45	35	30	25	25	3/60	8
100	100	90	80	65	50	40	35	30	30	1/60	9
100	100	95	90	70	55	45	40	30	30	NLP	10

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות

ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' -

את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

## (2) הגבלת שדה הראיה

		I
		הצטמצמות מרוכזת
		קוטר ממוצע של שדה ראייה
<u>בשתי העיניים</u>	<u>בעין אחת</u>	(1) עד 60°
10%	0%	(2) 40° עד 60°
20%	0%	(3) 20° עד 40°
40%	10%	(4) פחות מ-20°
100%	30%	II
10%	0%	אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה
60%	15%	III
		אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה
		IV
		HEMIANOPSIA HOMONYMOUS
		שמאלית -
	10%	(א) אובדן השדות העליונים בלבד
	40%	(ב) אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם או רק בחלקם התחתון
		V
		הצטמצמות אחרת של שדה הראיה
<u>בשתי העיניים</u>	<u>בעין אחת</u>	(א) אובדן של פחות מרבע שדה הראיה
0%	0%	(ב) אובדן הרבע החיצוני העליון
10%	5%	(ג) אובדן המחצית העליונה
15%	10%	(ד) אובדן הרבע החיצוני התחתון
30%	10%	(ה) אובדן המחצית התחתונה
65%	20%	

## 53. עקירת עין

5%	(1) מצב אחרי עקירת עין אחת (PHTISIS) בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח
100%	(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים
10%	(3) EXOPHTHALMUS או LAGOPHTHALMUS ניכרים
10%	(4) ENOPHTHALMUS (כולל PSEUDOPTOSIS) ניכר

#### 54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת<sup>6</sup>

מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין, אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח \*5%

#### 55. צניחת העין PTOSIS<sup>7</sup>

א חלקית -	
*10%	(1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה
	(2) המפריעה לראייה
15%	(א) חד צדדית
20%	(ב) דו צדדית
ב מלאה -	
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח; חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של	
3/60	

#### 56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות<sup>8</sup>

בשתי העיניים	בעין אחת	
0%	0%	(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות
15%	10%	(2) סגירה כללית של דרכי הדמעות
0%	0%	(3) חוסר דמעות בצורה קלה
15%	10%	(4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט

#### 57. פזילה ואיבוד אקומודציה AND LOSS OF STRABISMUS ACCOMMODATION<sup>9</sup>

10%	(1) HETEROPHORIA או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות
15%	(2) HETEROTROPIA ללא דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה
25%	(3) HETEROTROPIA עם דיפלופיה במבט פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת
5%	(4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה) בעין אחת או בשתי העיניים

#### 58. ברקית GLAUCOMA<sup>10</sup>

*10%	(א) GLAUCOMA, דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה
5%	(ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול
0%	(ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר, ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה סעיף 64)
5%	(ד) יתר לחץ תוך עיני - OCCULAR HYPER TENSION 22-28 מ"מ כספית ללא פגם

<sup>6</sup> פרט 54 - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

<sup>7</sup> פרט 55 - היות וטרם תוקנו התקנות הקובעות פריטים מנופים לשר"מ, לא נרשם סימן הניפוי ליד סעיפי הלקוי. למרות האמור, בפועל הפריטים מ-55 עד 60 כולל מנופים לשר"מ.

<sup>8</sup> פרט 56 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

<sup>9</sup> פרט 57 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

<sup>10</sup> פרט 58 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

פרט 58 (ב)(ג)(ד) - מנופים לנכות. אך לא סומן כוכב בצד סעיפי הלקוי היות ובטעות לא תוקן הפרט בתקנה (1).

בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28 מ"מ ייחשב לפי סעיף קטן (א))

**59. דלקת הלחמית והעפעפיים<sup>11</sup>**

דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית -

(א)	מצב קל	0%
(ב)	מצב בינוני	5%
(ג)	מצב קשה	10%

**60. גרענת TRACHOMA<sup>12</sup>**

\* גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59.

**61. קרנית CORNEAL OPACITIES**

כתמי קרנית - בנוסף לליקויי בחדות הראייה הנובע מהם -

(א)	באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר	5%
(ב)	שלא באזור המרכזי פחות מ-4 מ"מ	0%

**62. עדשה APHAKIA DISLOCATED LENS<sup>13</sup>**

בשתי העיניים	בעין אחת	
		חוסר עדשה או שינוי מקומה -
15%	10%	(1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה
10%	5%	(2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית
		(PSEUDOAPHAKIA) בנוסף לליקויי בחדות הראייה

**63. אישון: TRAUMATIC MYDRIASIS**

הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקויי בחדות הראייה -

(א)	קוטר האישון עד 5 מ"מ	*0%
(ב)	קוטר האישון למעלה מ-5 מ"מ	*5%

**64. קולובומה OF IRIS COLOBOMA**

קולובומה של קשתית - בנוסף לליקויי בחדות הראייה -

(א)	קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון	*0%
(ב)	גדולה או לא מוסתרת	*5%

**65. ענבית: דלקת הענבית UVEITIS<sup>14</sup>**

דלקת הענבית או מצב אחריה -

<sup>11</sup> פרט 59 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

<sup>12</sup> פרט 60 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

פרט 60 - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

<sup>13</sup> פרט 62 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

<sup>14</sup> פרט 65 - מנופה לשר"מ, ראה הסבר בפרט 55.

- (א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזרים 0%
- (ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים 20%
- (ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים 30%

**15. זוגיות: CORPUS VITREUM OPACITIES**  
עכירות בזוגיות - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -

- (1) בצורה קלה 0%
- (2) בצורה בינונית או קשה \*5%
- (3) מצב לאחר הוצאת הזוגיות - VITRECTOMY \*5%

**16. עדשה: ירוד CATARACT**

ירוד CATARACT בנוסף לליקוי בחדות הראייה \*5%

**17. רשתית**

- (א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה \*5%
- (ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה \*0%
- (ג) דלקת רשתית (CHORIORETINITIS) בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה \*5%

**פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון**

**18. אף .69**

<sup>15</sup> פרט 66(2) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

פרט 66(3) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

<sup>16</sup> פרט 67 - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

<sup>17</sup> פרט 68(א) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

פרט 68(ב) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

פרט 68(ג) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

<sup>18</sup> פרט 69 מנופה לשר"מ. ראה הסבר בפרט 55.

פרט 69(3)(ב) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.



		<b>שינויים בצורת האף החיצוני -</b>	(1)
0%	א	בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה	
20%	ב	בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים	
30%	ג	חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים	
		<b>הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל:</b>	(2)
		<b>ATROPHIC SINUSITIS, ALLERGIC RHINITIS; &amp; VASOMOTOR, RHINITIS</b>	
0%	א	הפרעה קלה עד בינונית	
10%	ב	הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה	
20%	ג	חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה	
		<b>אובדן חוש הריח והטעם</b>	(3)
0%	א	אובדן חוש הריח או חוש הטעם	
*5%	ב	אובדן חוש הריח והטעם	

**70. חך ובית הבלועה<sup>19</sup>**

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

פרט 69 - בנוסח המקורי:

		שינויים בצורת האף החיצוני	"(1)
**0%	(א)	בצורה קלה וללא הפרעות בנשימה	
**10%	(ב)	בצורה ניכרת הגורמים להפרעות בנשימה	
**30%	(ג)	חסר האף כולו או חלק ממנו: הנחיריים גלויים	
**20%	(2)	שינויים בפנים האף עם סתימת אף מוחלטת	
**5%	(3)	אובדן חוש הריח והטעם או חוש הריח בלבד	
	(4)	מחלות האף והגנות	
**	(א)	RHINITIS ARTOPHICA	
**	(ב)	RHINITIS VASOMOTORICA	
**	(ג)	RHINITIS ALLERGICA	
	(ד)	SINUSITIS	
**0%	(I)	בצורה קלה: אין הפרשה קבועה	
**10%	(II)	בצורה בינונית: הפרשה קבועה ישנם גלד (CRUSTA) והצטננויות תכופות	
**20%	(III)	בצורה קשה: הפרשה קבועה, ישנם גלד קשה והצטננויות תכופות מאד המחייבות שכיבה במיטה לעיתים תכופות מאד	

בק"ת 5856, התשנ"ה, עמ' 2, ת"ת 12.10.97, הוחלף לנוסח דלעיל.

**19 פרט 70 - בנוסח המקורי:**

		ליקויים בחך הרך	"(1)
*10%	(א)	בצורה קלה	
20%	(ב)	בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור	
	(2)	איבוד פחות ממצצית החך הקשה	
*10%	(א)	ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי	
20%	(ב)	אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי	
	(3)	איבוד מצצית או יותר מהחך הקשה	
*10%	(א)	ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי	
"30%	(ב)	אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי	

בק"ת 5856, התשנ"ה, עמ' 2, ת"ת 12.10.97, הוחלף לנוסח דלעיל.

		<b>ליקויים בחך הרך</b> (1)
*10%	א	בצורה קלה
20%	ב	בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור
		<b>חסר בחך הקשה</b> (2)
*10%	א	איבוד פחות ממחצית
20%	ב	איבוד מחצית או יותר
		<b>הלוע (PHARYNX)</b> (3)
*0%	א	דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע
5%	ב	דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה
20%	ג	הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה

**71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה (LARYNX & VOCAL CORDS, TRACHEA)**<sup>20</sup>

		<b>הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פגיעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה</b> (1)
0%	א	צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית)
	ב	צרידות קבועה
5%	(1)	בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור
10%	(2)	בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור
20%	(3)	בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו
30%	(4)	איבוד קול (APHONIA)
		<b>הפרעות בנשימה</b> (2)
5%	א	בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות
	ב	עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5 (1)
50%	ג	טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפונייה) (PERMANENT TRACHEOSTOMY)

**72. אוזניים**<sup>21</sup>

<sup>20</sup> פרט 71(1) מנופה לשר"מ.

פרט 71(2)(א) מנופה לשר"מ.

פרט 71 - בנוסח המקורי:

		צרידות	"(1)"
**5%	(א)	בצורה קלה הנגרמת עקב דלקת כרונית של מיתר הקול	
**10%	(ב)	בצורה ניכרת וקבועה	
**30%	(ג)	בצורה קשה, עם אבדן הקול, אפשרות לחישה בלבד (APHONIA)	
		שחפת של ה-LARYNX (2)	
**	(א)	שחפת פעילה המופיעה ביחד עם שחפת הריאות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 7 (שחפת הריאות)	
**	(ב)	שחפת שנתרפאה	
		אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (1)	
		מצר STENOSIS של ה-LARYNX או הקנה, קיימת השפעה על הקול או על הנשימה (3)	
*5%	(א)	בצורה קלה	
10%	(ב)	בצורה בינונית	
30%	(ג)	בצורה קשה	
"50%	(ד)	בצורה קשה מאד ומתמדת המחייבת TRACHEOSTOMY	

בק"ת 5856, התשנ"ה, עמ' 2, ת"ת 12.10.97, הוחלף לנוסח דלעיל.

פורסם בק"ת 5865, התשנ"ה, עמ' 117.

<sup>21</sup> הערה: פרט 72 (1) אינו מובא בחשבון לענין קיצבת נכות כללית כאשר הירידה בשמיעה באחת האוזניים לא עולה על 40 דציבל ולענין קיצבת שירותים מיוחדים כאשר אחוז הנכות אינו עולה על 45%.

(1) ליקוי שמיעה

אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:

לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית

הפחתת כושר השמיעה	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	יא	יב	יג	יד
בדציבלים	15	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	למעלה
15-20	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10
21-25	0	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	15	15
26-30	0	5	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20
31-35	0	5	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
36-40	5	5	10	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
41-45	5	10	10	15	20	25	25	25	30	30	30	30	30	30
46-50	5	10	15	20	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35
51-55	5	10	15	20	25	30	30	30	35	35	40	40	40	40
56-60	5	10	15	20	25	30	30	30	35	40	40	45	45	45
61-65	5	10	15	20	25	30	30	30	35	40	45	45	50	50
66-70	10	10	15	20	25	30	30	30	35	40	45	50	50	50
71-75	10	10	15	20	25	30	30	30	35	40	45	50	50	50
76-80	10	15	20	25	30	30	30	30	35	40	45	50	55	55
למעלה מ-80	10	15	20	25	30	30	30	30	35	40	45	50	55	60

המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 1-14 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-ד' באוזן השנייה. האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 500-1000-2000 מחזורים בשנייה.

(2) אוזן היצונית

**10%	(א) חוסר אפרכסת אחת
**20%	(ב) חוסר שתי האפרכסות
	(ג) דלקת האוזן היצונית
***5%	(I) ישנן החמרות נדירות והפרשה
**10%	(II) ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת האוזן היצונית

(3) אוזן תיכונה

***	(א) צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב- PROCESSUS MASTOIDEUS אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה
	(ב) מצב לאחר ניתוח רדיקלי
**0%	(I) החלל יבש
**10%	(II) קיימת הפרשה קבועה
	(ג) דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם
**10%	(I) חד-צדדית
**15%	(II) דו-צדדית

פרט 72(3)(א) - הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

	(ד)	המצב כמו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם
**20%	(I)	חד-צדדית
**25%	(II)	דו-צדדית

לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף קטן (3) ב,ג,ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה.

	(4)	<b>אוזן פנימית</b>
	(א)	פגיעה בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה
	(ב)	<b>פגיעה בחלק הוטיבולרי</b>
10%	(I)	בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה)
20%	(II)	בצורה בינונית - ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסגמוס רפלקסים פתולוגיים
40%	(III)	בצורה קשה - ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים
100%	(IV)	בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה
	(ג)	<b>מחלת MENIERE</b> אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגיעות אלה
	(ד)	<b>הבלה אקוסטית</b> (עם עקומת שמיעה אופיינית)
0%	(I)	ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור
10%	(II)	עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור
	(III)	כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו

### פרק שמיני: לסתות ושיניים

#### 73. לסתות

	(1)	<b>לסת עליונה</b>
	(א)	שבר הלסת העליונה עם העתקה (DISPLACEMENT)
0%	(I)	בצורה קלה, המנשך תקין
*10%	(II)	בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך
20%	(III)	בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך
	(ב)	אי התאחות (NON UNION) של הלסת העליונה
*10%	(I)	בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך
20%	(II)	בצורה בינונית
30%	(III)	בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך
	(ג)	אבדן המכתשית (PROCESSUS ALVEOLARIS OSSIS MAXILLAE SUPERIORIS)
10%	(I)	לאורך מחצית הלסת העליונה
20%	(II)	לאורך כל הלסת
	(2)	<b>לסת תחתונה</b>
	(א)	<b>LUXATIO HABITUALIS</b>
0%	(I)	בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה
10%	(II)	בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה
20%	(III)	בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה
	(ב)	הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-מנדיבולרי (TEMPORO-MANDIBULARIS)
10%	(I)	בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 1.5 ועד 1 ס"מ
20%	(II)	בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-1 ועד 0.5 ס"מ
40%	(III)	בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-0.5 ס"מ
100%	(IV)	איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה
	(ג)	(חסר במקור)
	(ד)	איבוד חצי הלסת
50%	(I)	איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה
40%	(II)	איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו

		(ה) איבוד ענף עולה (RAMUS ASCENDENS) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי
30%	(I) מצד אחד	
50%	(II) משני הצדדים	
		(ו) איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים
10%	(I) מצד אחד	
20%	(II) משני הצדדים	
		(ז) איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (CONTINUITY)
10%	(I) מצד אחד	
20%	(II) משני הצדדים	
		(ח) איבוד ה-PROCESSUS CONDYLOIDEUS
20%	(I) מצד אחד	
30%	(II) משני הצדדים	
		(ט) איבוד ה-PROCESSUS CORONOIDEUS
10%	(I) מצד אחד	
15%	(II) משני הצדדים	

#### 74. שיניים

	(1) <b>אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות</b>
**40%	(א) כל השיניים
**20%	(ב) כל השיניים של הלסת העליונה
**20%	(ג) כל השיניים של הלסת התחתונה
***0.5%	(ד) אבדן שן בודדת
	"שן" - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן שתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש.
***	(ה) באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי סעיף קטן (1)ד
***	(ו) באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית
***	(ז) אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי נכות.
***	(ח) באבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעה בהתאם לסעיף-קטן (1) (א,ב,ג,ד)

### פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגיונות בעור

#### 75. צלקות

	(1) <b>צלקות בגוף</b>
**0%	(א) שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן
***10%	(ב) מכאיבות או מכערות
**20%	(ג) נרחבות באזורים מרובים
**	(ד) המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19
**	(ה) מחוברות לרקמות או אברים, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות
	(2) <b>צלקות הפנים והצוואר</b>
**0%	(א) שטחיות ובלתי מכערות
**10%	(ב) מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים
**20%	(ג) רחבות עם כיעור ניכר
**30%	(ד) רחבות או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים
**50%	(ה) הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה

**0%	ALOPECIA AREATA	
		.77
**20%	ALOPECIA UNIVERSALIS	
		.78
	ULCUS TROPICUM	
***10%	ההפרעות בלתי ניכרות	(1)
**20%	ההפרעות בינוניות	(2)
**30%	ההפרעות ניכרות	(3)
		.79
	ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS	
**0%	בצורה קלה ומוגבלת	(1)
**10%	בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב	(2)
**20%	הצורה הקשה עם היווצרות KELOIDS המעוררים דחיה	(3)
		.80
	ECZEMA כרונית	
**0%	ההפרעות בלתי ניכרות	(1)
***10%	ההפרעות קלות	(2)
**20%	ההפרעות בינוניות	(3)
30%	בצורה קשה, ההפרעות כלליות ניכרות ומעוררות דחיה	(4)
		.81
	LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM	
**0%	בצורה קלה	(1)
**10%	בצורה בינונית	(2)
**20%	בצורה קשה	(3)
		.82
	CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES	
**0%	בצורה קלה	(1)
**10%	בצורה קשה, הפרעות בהליכה	(2)
		.83
**	DERMATITIS	
	DERMATITIS מכל הסוגים פרט ל-DERMATITIS ACTINICA או X-RAY	
	DERMATITIS - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.	
		.84
**	DERMATITIS ACTINICA	
	אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.	
		.85
**	X-RAY DERMATITIS	
	אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75	
		.86
	ERYSIPELAS RECIDIVANS	
10%	בצורה קלה, 1-6 התקפים לשנה	(1)

- 20% בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש (2)
- 30% בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של ELEPHANTIASIS NOSTRAS (3)
- 50% (א) ברגל אחת
- (ב) בשתי הרגליים

**87. שחפת העור**

- (1) **במצב של פעילות התהליך**
  - 30% (א) בצורה קלה, שינויים מוגבלים
  - 50% (ב) בצורה קשה, שינויים נרחבים
- (2) **במצב של יציבות**
  - 10% (א) בצורה קלה, השינויים מוגבלים
  - 20% (ב) בצורה קשה, השינויים נרחבים
- (3) **שחפת העור שנתרפאה**  
נשארו צלקות בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75

**88.**

ERYTHEMA INDURATUM

\*\*20% BAZIN

**89.**

PEMPHIGUS VULGARIS

- 100% (1) בשלב החריף הדורש אשפוז
- 50% (2) בשלב של רמיסיה

**90.**

LEISHMANIASIS

- \*\*20% (1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים
- \*\*10% (2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים
- \*\* (3) צלקות לאחר LEISHMANIASIS - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75

**פרק עשירי: פיגור שכלי**

**22.91**

- 20% (1) פיגור גבולי (מנת משכל 70-79)
- 40% (2) פיגור קל (מנת משכל 55-69)
- 65% (3) פיגור בינוני (מנת משכל 40-54)
- 75% (4) פיגור קשה (מנת משכל 30-39)
- 100% (5) פיגור חמור (מנת משכל 0-29)

**חלק ב' - מחלות-מקצוע**

**פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור**

**1. הרעלות<sup>23</sup>**

<sup>22</sup> פרט 91 - נוסף בק"ת 4655, התשמ"ד, עמ' 1871, ת"ת 27.6.84.

<sup>23</sup> פרט 1 - בק"ת 1019, תש"ך, עמ' 1269, ת"ת 16.6.60, אחרי המילים "הרעלת זרניך" בא "ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכותיו".

הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מגנז, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.

## 2. מחלות עור

OCCUPATIONAL DERMATOSES - הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים

0%	(א)	ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם
10%	(ב)	ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם
20%	(ג)	ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות
30%	(ד)	ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף

## פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

### 3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם -<sup>24</sup>

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

### 4. תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת -<sup>25</sup>

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

## 5. שחפת

	(1)	<b>שחפת הריאות</b>
	(א)	שחפת פעילה -
100%	(1)	שחפת פעילה (UNSTABLE) הדורשת טיפול
75%	(2)	שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל
	(ב)	שחפת בלתי פעילה -
	(1)	
50%	(א)	בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה
60%	(ב)	בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיזיולוגיים רחבים
70%	(ג)	בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיזיולוגיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים
80%	(ד)	בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי דם הדירים ניכרים PULMONALE

(2)

<sup>24</sup> פרט 3 - בנוסח המקורי: "גחלת". בק"ת 1019, תש"ך, עמ' 1269, ת"ת 16.6.60, הוחלף לנוסח דלעיל.

<sup>25</sup> פרט 4 - בנוסח המקורי: "בלוטית" בוטל בק"ת 1019, תש"ך, עמ' 1269, ת"ת 16.6.60.

בק"ת 2719, תשל"א, עמ' 1404, ת"ת 22.7.71, הוסף מחדש בנוסח דלעיל.



- (א) 30% שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה STABLE ARRESTED
- (ב) 40% שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים
- (ג) 50% שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם
- (ד) 70% שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי דם ניכרים

(3)

- (א) 10% שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה
- (ב) 20% שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים
- (ג) 30% פעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים
- (ד) 60% שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים

(4)

- (א) 5% שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מ-5 צלעות
- (ב) 10% שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מ-5 צלעות
- (ג) 5% שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט
- (ד) 10% שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה
- (ה) 15% שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה
- (ו) 20% שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה
- (ז) 30% שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השנייה

בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

שחפת בלתי פעילה שנרפאה: (ג)

- (1) קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוריה 10% לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
- (2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת

## 6. ברוצלוזיס

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

**7. שיתוק ילדים**

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

**8. קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס**  
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

**9. צפדת**

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

**10 סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף**<sup>26</sup>  
בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.

**11. צורנית**

(1) צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.

(2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

**12. אמינית**

בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

**13. ירוד**

בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.

**14. מחלות קייסון**

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

**15. עוויות**

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

**16. מחלות קרינה**

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

**17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים**<sup>27</sup>

בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.

**18. בורסיטיס**

תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.

**19. ליקויי שמיעה**<sup>28</sup>

בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

## **חלק ג': מבחנים בנסיבות מיוחדות**

**1. דרגת נכות מורכבת**

בוטל.

<sup>26</sup> פרט 10 - בק"ת 1019, תש"ד, עמ' 1269, ת"ת 16.6.60, אחרי המילים "סרטן עור... קרנית העין" בא "וסרטן הרירית... הקשורות באף".

<sup>27</sup> פרט 17 - בק"ת 1504, תשכ"ד, עמ' 150, ת"ת 31.10.63, אחרי "פרקים" בא "גידים".

<sup>28</sup> פרט 19 - נוסף בק"ת 1504, תשכ"ד, עמ' 150, ת"ת 31.10.63.

2. דרגת נכות בקשיון ובשיתוק  
בוטל.

3. קביעת דרגת נכות מחוץ למבחנים  
בוטל.

4. דרגת נכות של איטר<sup>29</sup>  
בוטל.

## חלק ד': פיגור שכלי<sup>30</sup>

<sup>29</sup>הערה: חלק ג' נוסף בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת 27.6.74 בנוסח:

"1. דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה - הוא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים לאותן פגימות החלים על אותו נפגע, שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:

(1) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה - אחוז הנכות שנקבע כאמור;

(2) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השני במעלה - מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים;

(3) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה - מספר אחוזים מן הכושר המופחת האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים; וכן הלאה.

2.

(א) בקביעת דרגת נכותו של נפגע שנפגם -

(1) בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד - לא יובא בחשבון הנזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.

(2) בשיתוק עצב גדול אחד - לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שגרם לשרירים המעוצבים על ידיו.

(ב) דרגת נכותו של נפגע שנפגם -

(1) בכמה פגימות באותו פרק - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק;

(2) בכמה פגימות באותה גפה - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, אלא אם נקבעו לאחת מהפגיעות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(3) בכמה פגימות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין.

(ג) דרגת נכותו של נפגע כמה פגימות בזרוע הימנית, תחושב לפי סעיף 1 לחלק זה, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.

3. לא פורטה הפגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי הפגימה הדומה לה, לדעת הועדה, מבין הפגימות שנקבעו במבחנים.

4.

(א) דרגת נכות לרגל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים בידי ימין ופגימה ביד ימין כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד שמאל.

(ב) היו שתי הידיים שוות כוח, לא תחול ההוראה שבסעיף קטן (א)

חלק ג' בוטל בק"ת 5737, תשנ"ו, עם 580, ת"ת - 30 ימים מיום 22.2.96.

<sup>30</sup>הערה: נוסף בק"ת 3219, תשל"ד, עמ' 1848, 30.8.74, בנוסח:

(1) מנת משכל 65 עד 74 (פיגור קל בדרגה גבוהה) 35%

(2) מנת משכל 55 עד 64 (פיגור קל) 50%

(3) מנת משכל 40 עד 54 (פיגור בינוני) 65%

(4) מנת משכל 30 עד 39 (פיגור קשה) 75%

(5) מנת משכל 0 עד 29 (פיגור חמור) 100%

בוטל בק"ת 4655, התשמ"ד, עמ' 1871, ת"ת 27.6.84.

(בוטל)

---